

QXY CLASSIC

- hoog kwaliteit barrièrefolie, 80 µ dik
- zwart-wit
- extreem zuurstofdicht 0 - 1 cm³/m²/24 uur
- zeer prik- en scheurbestendig
- kan worden gebruikt zonder onderfolie
- verkrijgbaar tot 76 m breedte
- laag gewicht, eenvoudige handling
- milieuvriendelijk, volledig recyclebaar



ecologischer
door minder plastic
en een hogere
zuurstofdichtheid

OXY CLASSIC

Waarom 80 μ ? – Landbouw uit verantwoorde- lijkheid!

Stel u voor hoeveel plastic er jaarlijks wordt geproduceerd, vervoerd, gebruikt en vervolgens gerecycled:

Tot 55 % minder plastic met de OXY CLASSIC!

90 kg standaard folie

150 μ hoofdfolie + 40 μ onderfolie
ongeveer 90 kg bij 10 m x 50 m

40 kg OXY CLASSIC

80 μ enkele hoofdfolie
ongeveer 40 kg bij 10 m x 50 m

Dit betekent:

- ✓ tot 55 % minder kunststofgranulaat moet geproduceerd en vervoerd worden
- ✓ tot 55 % minder kuilfolie moet worden verwerkt en vervoerd
- ✓ tot 55 % minder gebruikte folie moet worden gerecycled

Dat noemen wij duurzaam!

Gemaakt van de beste grond- stoffen voor

- scheurvastheid
- elasticiteit
- weerstand tegen perforatie

Hoe beschermen we onze 80 μ ?

Snavels en klauwen veroorzaken jaarlijks grote schade aan silo-afdekkingen van allerlei aard. Silo dekzeilen helpen slechts in beperkte mate, omdat de smalle klauwen van vogels die over de

silospringen door het dekzeil heen komen en de folie beschadigen. Veel kleine, vaak onzichtbare gaatjes, waaronder zich schimmel en bederf vormt, zijn het gevolg. Kan dit niet beter? Ja! Met OXY Protec®! (Meer informatie op de achterzijde)



Zuurstofdoorlaatbaarheid (volgens DLG-standaard)

Standaard
PE silofolie
250
 $\text{cm}^3/\text{m}^2/24$ uur

OXY CLASSIC
0 - 1
 $\text{cm}^3/\text{m}^2/24$ uur

OXY CLASSIC

Beschermen van voedingsstoffen en zorgen voor voederhygiëne

Terwijl schimmels vrij langzaam groeien, reageren gisten op gunstige omstandigheden met een snelle vermenigvuldiging. De onderstaande grafiek laat duidelijk zien hoe de duur van de blootstelling aan lucht de groei van de populaties doet toenemen.

Velen denken dat zolang het kuilvoer afgedekt wordt opgeslagen, de invloed van zuurstof een geringe rol speelt. Het is pas wanneer de kuil wordt geopend dat het gevaarlijk wordt. Men vergeet dat er gedurende de hele opslagperiode zuurstof door een polyethyleenfilm in de silo sijpelt. Gisten en schimmels profiteren hiervan, het aantal kolonievormende eenheden (kve) neemt toe.


Hoe intensiever de gisten en schimmels zich onder de folie hebben ontwikkeld, hoe meer voedingsstoffen zij zullen verbruiken wanneer de silo wordt geopend en lucht van het snijvlak wordt toegevoegd.

Conclusie: Hoe langer de opslagperiode, hoe meer lucht er door een "normale" polyethyleen kuilfolie naar binnen sijpelt. Onder de gasdichte OXY CLASSIC daarentegen worden gisten en schimmels onderdrukt en is de voederhygiëne zichtbaar beter. Dit is niet alleen positief voor de winstgevendheid, maar ook een pluspunt voor de gezondheid van de dieren!

Een evaluatie van 31 studies met verschillende folies leverde de volgende bevindingen op over het algemene effect van barrièrefolies op kuilvoer:

- onder de barrièrefolie ging 41,5 % (= 81 kg/t) minder DM verloren in de bovenste 50 cm door het aanzuigen van lucht
- in de bovenste 50 cm onder de barrièrefolie was er 72 % (77,4 kg/t) minder bedorven/beschimmelde kuil (totaal verlies)
- de stabiliteit in open lucht verlengde met de barrièrefilm van 3,1 tot 5,6 dagen

Weergave van verliezen



OXY CLASSIC is beschikbaar in de volgende maten

lengte x breedte		6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
m																	
50		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
150				✓		✓	✓	✓	✓	✓							
300							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

speciale breedtes en lengtes op aanvraag

QXY CLASSIC

Dek zo snel mogelijk af!



Dit garandeert het energie- en nutriëntengehalte en voorkomt latere problemen op de voedertafel. Zelfs na het openen worden schadelijke organismen weer actief en versnellen ze het bederf van de kuil.

Hoe sneller we afdekken, hoe minder ze zich vooraf kunnen vermenigvuldigen.

Breng het los aan en zorg voor voldoende overlap!

Strak gelegde folies zijn gevoeliger. Ze kunnen niet meer optimaal renderen wanneer er fermentatiegassen gevormd worden en zijn gevoeliger voor beschadiging door betreden te worden. Los leggen zorgt voor een optimale aanpassing aan het oneffen kuiloppervlak.

Geschikte luchtbarrières – gebruik geen banden en zand!



Stijve banden passen zich niet aan het silo-oppervlak aan. Ze vormen geen continue zuurstofbarrière. Vooral na het openen kan de zuurstof in de rolbanen en op de hellingen ongehinderd onder de folie doorgaan en gisten en schimmels activeren.



Banden ververen ook na verloop van tijd en het stalen gaas doorboort de folie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen draden zelfs in het voer terecht komen en de koe verwonden.

Zandzak: Nee! Grindzak: Ja!

De beste oplossing zijn silozakken gevuld met grind. Deze zijn gemakkelijk te hanteren, kunnen variabel worden gebruikt en kunnen meerdere jaren achter elkaar worden gebruikt.

Wanneer ze als dwarsbarrière worden gelegd, bereikt de zuurstof ze alleen. Zelfs als er ongemerkt gaten in het midden van de silo zitten, wordt voorkomen dat de zuurstof zich onder de folie verspreidt.



Onderschat schade door klauwen niet!

Kuildekzeilen zijn goed, ze beschermen tegen hoeven of klauwen – met scherpe klauwen verschuift de dekzeilenstructuur, de klauwen komen er wel in en beschadigen de folie.

Een extra dik vlies kan hier helpen. Klauwen worden onderscheept.



Optimale bescherming betekent in de praktijk:

- goede bedekking (snel, los gelegd en vastgezet met barrières) is belangrijk
- vermindering van kleine gaatjes door vogels, katten enz. met 68 % (bij gebruik van kuilvlies)
- minder zuurstof inbreng, minder bederf, minimaal afval
- basisvoer van hoge kwaliteit
- kostenreductie omdat er minder krachtvoer nodig is