

# OXY Barriere UZF

Barierowa folia podkładowa

- do użycia pod dowolną folią wierzchnią
- bardzo wysoka szczelność tlenowa: 0 - 3 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24 h
- 45 μ folia wielowarstwowa wykonana z polietylenu i komponentów folii barierowych
- mniej odrzucanej kiszonki, mniej strat na krawędziach i wierzchu
- zmniejsza straty suchej masy, wyższa jakość paszy
- wspomaga rozwój bakterii kwasu mlekowego, szybkie obniżenie wartości pH
- mniejsze koszty utylizacji, w pełni nadająca się do recyklingu
- do 32 m szerokości

OXY Barriere UZF jest dostępna w następujących rozmiarach

długość x szerokość																	
m	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
50	33	33	33	33	33	33	33	33	33	28							
150			11	11	11	11	11	8	8	8		3	3	3	3	3	3
300			2		2		2	2	2	2	2						

kursywa = ilość na palecie



ekologiczna  
mniej tworzywa sztucznego, większa gazoszczelność

# OXY Barriere UZF

## Przykrywać kiszonkę jak najszybciej!



Zapewnia to zachowanie odpowiedniego poziomu energii i składników odżywczych oraz zapobiega przyszłym problemom przy skarmianiu. Po otwarciu patogeny ponownie stają się aktywne i przyspieszają psucie się kiszonki.

Im szybciej ją przykryjemy, tym mniej zdąży się ich wcześniej rozmnożyć.

## Położyć luźno i zaplanować wystarczająco dużo folii na zakładki!

Mocno naciągnięte folie są bardziej podatne na uszkodzenia. Nie są już w stanie poddać się, gdy tworzą się gazy fermentacyjne i są bardziej narażone na uszkodzenia spowodowane chodzeniem po nich. Luźne rozmieszczenie jest ważne dla optymalnego dostosowania do nierównej powierzchni kiszonki.

## Zrobić odpowiednie bariery powietrzne, zrezygnować z opon i piasku!



Sztywne opony nie dostosowują się do powierzchni silosu. Nie tworzą ciągłej bariery tlenowej.

Zwłaszcza po otwarciu tlen może bez przeszkód przenikać do nierówności po walcu i na bokach pod folią i aktywować drożdże i pleśń.

Opony z czasem również ulegają zniszczeniu, a ich stalowe części przebijać folię. Może to dostać się również do paszy i zranić krowę.



## Worki z piaskiem: nie ! Worki ze żwirem: tak!

Najlepszym rozwiązaniem są worki silosowe wypełnione żwirem. Są łatwe w obsłudze, uniwersalne i można je stosować przez kilka lat.

Przy rozłożonych w poprzek, jako barierę, workach, tlen dociera tylko do tego punktu i nie wnika w głąb kiszonki. Nawet jeśli w środku silosu znajdują się niezauważalne otwory, tlen nie może przedostać się pod folię.



## Uszkodzenia spowodowane pazurami, nie lekceważ!

Siatki ochronne na silosy są dobre, chronią przed kopytami i pazurami – jeśli pazury są ostre, struktura siatki ulega przesunięciu, pazury przebijają się i uszkodzają folię.

W tym przypadku może pomóc dodatkowa, gruba włóknina ochronna, która temu zapobiegnie.



## W praktyce optymalna ochrona oznacza:

- ważne jest dobre pokrycie (szybkie, luźne nałożenie i zabezpieczenie barierami)
- redukcja drobnych dziurek wyrządzonych przez ptaki, koty itp. o 68 % (przy stosowaniu włókniny kiszonkowej)
- mniejszy dopływ tlenu, mniejsze psucie się, minimalne odpady
- pasza wysokiej jakości
- redukcja kosztów dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na paszę treściwą